



ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA

Estudo quantitativo Duarte Vilar Fevereiro 2012







INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP



Em parceria com

CARACTERIZAÇÃO GERAL


CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA




SITUAÇÃO PROFISSIONAL ACTUAL E ESCOLARIDADE



RELIGIOSIDADE




- Indiferente
- Ateu/ateia (não acredita em nenhum Deus)
- Agnóstico(a) (não sabe se Deus existe)
- Católico(a) praticante
- 5
- Católico(a) não praticante
- Outra religião cristã.
- Outra crença religiosa.




- Todos os dias
- Mais de uma vez por semana
- Uma vez por semana
- Pelo menos uma vez por mês
- Raramente
- Nunca

ESTADO CIVIL E PARENTALIDADE



Tem filhos?




Orientação sexual

		Masculino	Feminino
Normalmente sente-se atraída/o	Só por rapazes/homens	2,4%	90,2%
	Só por raparigas/mulheres	90,2%	1,0%
	Por raparigas/mulheres e rapazes/homens	1,0%	2,0%
	NR	6,4%	6,8%
Total	100,0%	100,0%	


		Masculino	Feminino
Alguma vez teve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo?	Sim	4,1%	4,9%
	Não	90,2%	90,2%
	NR	5,8%	4,9%
Total		100,0%	100,0%

EDUCAÇÃO SEXUAL

APRENDIZAGEM SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA



NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO NA 1ª RELAÇÃO SEXUAL E ACTUALMENTE



RESPOSTAS CERTAS (1)

Contar os dias é um bom método para se evitar uma gravidez	41,9
O 1.º dia de um ciclo é o 1.º dia da menstruação	37,7
O período fértil da mulher é no dia a seguir a ter acabado o período	43,9
Todos os anos se deve fazer o descanso da pílula	28,7
É possível engravidar mesmo que se tenha poucas vezes relações sexuais	91,9
O adesivo contraceptivo é um método hormonal que é colocado uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas	17,4
A pílula previne o contágio do HIV/SIDA e outras infecções sexualmente transmissíveis	85,8
A contracepção de emergência só pode ser feita até 24h depois da relação sexual de risco	25,1
O “aparelho” ou Dispositivo Intra-Uterino (DIU) é um método de contracepção muito seguro	41,9
Na primeira vez que se tem relações sexuais nunca se engravida	87,6
Qualquer homem acima dos 25 anos pode fazer uma vasectomia (método contraceptivo cirúrgico)	28,7


RESPOSTAS CERTAS (2)

O preservativo feminino pode ser introduzido na vagina até 8 horas antes da relação sexual	13,3
O único método que previne as infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo	79,7
O “aparelho” ou Dispositivo Intra-Uterino (DIU) é um método só para mulheres que já tiveram muitos filhos	55,5
O adesivo contraceptivo é um método hormonal que pode ser aplicado no braço, nas costas, no abdómen ou na nádega	40,3
Para confirmar uma gravidez é necessário fazer um teste ou uma ecografia	86,1
Uma jovem que ande na escola e fique grávida é obrigada, por lei, a abandonar a escola	82,2
O implante contraceptivo é um método contraceptivo hormonal que se aplica por baixo da pele	57,2
Se, na relação sexual, o homem ejacular fora da vagina, não há qualquer risco de gravidez	54,8
Os homens não podem ir às consultas de planeamento familiar	80,2
Se a mulher se lavar bem depois de ter tido relações sexuais não existe risco de gravidez	87
Durante a gravidez pode-se ter relações sexuais	90,2

RESPOSTAS CERTAS (3)


O anel contraceptivo é um método hormonal que se introduz na vagina, onde deve ser mantido durante 3 semanas	18,8
Uma mulher com mais de 40 anos ainda pode engravidar	89,3
Há métodos contraceptivos que são disponibilizados gratuitamente nos Centros de Saúde	88,1
No homem e na mulher, a sexualidade tem uma idade para começar e para terminar	76
Os homens têm muito mais necessidades sexuais do que as mulheres	44,7
Qualquer mulher acima dos 25 anos pode fazer uma laqueação das trompas (método contraceptivo cirúrgico)	43,1
Actualmente, podem-se curar doenças como a sífilis e a gonorreia	36,5
O adesivo contraceptivo é um método hormonal que também pode ser utilizado pelos rapazes	39,7
A masturbação é um comportamento sexual que pode existir em todas as idades	78,7
Só homossexuais, prostitutas e toxicodependentes podem ser infectados pelo HIV/SIDA	82,5
A homossexualidade é considerada cientificamente como uma doença ou um desvio	59,2
O anel contraceptivo interfere com o acto sexual, por isso deve ser retirado quando a pessoa tem relações sexuais	49,6
Uma mulher que faça laqueação das trompas continua a menstruar	38,9
A clamídia é um tipo de infecção urinária	9,5
A vacina contra o HPV (vírus do cancro do colo do útero), só pode ser feita por jovens mulheres até aos 25 anos	31,8
Um casal (em que a mulher tem menos de 35 anos) que tenta e não consegue uma gravidez ao fim de um ano, tem um problema de infertilidade	31,9

NÍVEL GERAL DE INFORMAÇÃO POR SEXO




RELAÇÕES SEXUAIS

RELAÇÕES SEXUAIS




IDADE DE INÍCIO DAS RELAÇÕES SEXUAIS




USO DA CONTRACEPÇÃO


Antes da 1ª relação sexual conversaram como evitar a gravidez




Protegeram-se efectivamente?




Métodos utilizados na 1ª RS




Porque não usaram contracepção




Não uso – por sexo




Conversaram sobre prevenir IST?



Tem actualmente algum relacionamento sexual




Uso do preservativo




Que método utilizam habitualmente


Valid Percent



Desde que mantém este relacionamento já lhe aconteceu ter tido relações sexuais com outra pessoa?




Uso do preservativo em relações paralelas




COMPORTAMENTOS DE RISCO

Sexo pago




Gravidez inesperada



F





M




Decisão sobre a gravidez inesperada



Relações sexuais sob o efeito do álcool e drogas




Nos últimos 12 meses teve RS com alguém que toma drogas injectáveis?





RECURSO A SERVIÇOS DE SAÚDE E DE AJUDA

Pedido de ajuda




Recurso a serviços de saúde e ajuda




INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS


Ocorrência de IST nos últimos 5 anos



Percepção de vulnerabilidade




Realização do teste de VIH/SIDA nos últimos 12 meses



DIFICULDADES SEXUAIS

Ocorrência de dificuldade sexual no último ano



Ocorrência de dificuldades sexuais nos últimos 12 meses

